

Los **factores de la PANSS** se calcularon para cada paciente según la fórmula ofrecida por el estudio de validación española de la escala PANSS (Peralta y Cuesta, 1994), es decir, se sumó la puntuación de los elementos con cargas superiores a 0,50 y se dividió por el número de elementos contribuyentes al factor:

PANSS. The **factors** were calculated for each patient according to the formula obtained in the Spanish validation of the PANSS (Peralta y Cuesta, 1994), i.e., by adding the scores on the items loading higher than 0.50 and dividing by the number of items contributing to that factor:

FPC1N: /8

- N1. Embotamiento afectivo (*Blunted Affect*)
- N2. Retraimiento emocional (*Emotional Withdrawal*)
- N3. Contacto pobre (*Poor Raport*)
- N4 Retraimiento social (*Passive/Apathetic Social Withdrawal*)
- N5. Dificultad en el pensamiento abstracto (*Difficulty in Abstract Thinking*)
- N6. Ausencia de espontaneidad y fluidez en la conversación (*Lack of Spontaneity and Flow of Conversation*)
- N7. Pensamiento estereotipado (*Stereotype Thinking*)
- PG16. Evitación social activa (*Active Social Avoidance*)

FPC2P: /4

- P1. Delirios (*Delusions*)
- P3. Comportamiento alucinatorio (*Halucinatory Behaviour*)
- P6. Suspicacia/Perjuicio (*Suspiciousness/Persecution*)
- PG9. Inusuales contenidos del pensamiento (*Unusual Thought Content*)

FPC3D: /3

- P2. Desorganización conceptual (*Conceptual Disorganization*)
- PG11. Atención deficiente (*Poor Attention*)
- PG12. Ausencia de juicio e *insight* (*Lack of Judgement and Insight*)

FPC4E: /3

- P4. Excitación (*Excitement*)
- P7. Hostilidad (*Hostility*)
- PG14. Control deficiente de impulsos (*Poor Impulse Control*)

FPC5A: /3

- PG2. Ansiedad (*Anxiety*)
- PG4. Tensión motora (*Tension*)

FPC7DP: /3

- PG3. Sentimientos de culpa (*Guilt Feeling*)
- PG6. Depresión (*Depression*)
- PG7. Retardo motor (*Motor Retardation*)